

Mancozil®

Mancozeb 800 g/Kg

Formulación	: Polvo Mojable (WP)
Modo de Acción	: Preventivo y de contacto
Mecanismo de Acción	: Actividad multisitio
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso
Grupo Químico	: Dithiocarbamato

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Mancozil es un fungicida agrícola que destaca dentro de los fungicidas del grupo de los carbamatos. Se caracteriza por tener una gran micronización, lo que le permite aumentar su acción de cobertura sobre el área foliar. Mancozil puede ser utilizado en diversas condiciones climáticas. Debido a su buena adherencia, aún después de llover, continúa controlando las enfermedades eficazmente.

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. El gasto de agua en cultivos en general es de 400 l/ha y para frutales 1000 l/ha. El volumen de agua varía de acuerdo al tamaño de la planta, edad, cultivo, etc.

Para proteger a la semilla de Arroz de la "Mancha carmelita", se le tratará con 2 - 5 g de Mancozil por cada kg de semilla. Los granos de arroz deben mezclarse con el fungicida en polvo en una manta o en un depósito apropiado a la cantidad de semilla que se desee desinfectar, procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con las semillas, mediante el movimiento lento de la mezcla.

Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días, en casos de severos ataques de la enfermedad de 4 a 5 días.

Mancozil tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados y es compatible con la mayoría de los plaguicidas, exceptuando los de reacción alcalina.

Primeros Auxilios

Si se ingiere realizar un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administrar laxantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 g). En caso de deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se presentan dificultades respiratorias administrar oxígeno o dar respiración artificial. En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por 15 minutos.

Indicaciones para el médico:

El médico instituirá un tratamiento sintomático.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.



