



Mancozil®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Mancozeb, 800 g/kg
Aditivos, csp 1 kg

Reg. N° 055-96-AG-SENASA

Titular del Registro e Importador:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Dow AgroSciences de Colombia S.A
Apartado aéreo 53895
Santa Fé de Bogotá
Colombia

Distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido Neto:

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del Grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Durante su manipuleo (preparación de la mezcla y aplicación) deben emplearse máscara, guantes protectores y ropa apropiada. No comer, beber ni fumar. Terminada la labor, lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.

Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes agua. Almacenarlo en su envase herméticamente cerrado en lugares adecuados, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios, forrajeros, medicinas y bebidas. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. No permitir que el producto se moje, esto puede producir cambios químicos que reducirán su efectividad como fungicida y generar gases que pueden ser inflamables.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Ditiocarbamatos

Si se ingiere realizar un lavado estomacal con carbón medicinal en agua y administración de laxantes salinos (Sulfato de sodio 20-30 gr). En caso de deshidratación, administrar líquidos y sal. Si se presentan dificultades respiratorias administrar oxígeno o dar respiración artificial. En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por 15 minutos.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:

Trátase sintomáticamente.

ANTIDOTO:

No existe antídoto específico. Seguir las indicaciones del médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

GENERALIDADES:

Mancozil es un fungicida agrícola ditiocarbamato recomendado para el control de las enfermedades señaladas en el cuadro de uso.

INDICACIONES DE USO:

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar una pre-mezcla diluyendo el producto en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. El gasto de agua en cultivos en general es de 400 l/ha y para frutales 1000 l/ha. El volumen de agua varía de acuerdo al tamaño de la planta, edad, cultivo, etc.

Para proteger a la semilla de Arroz de la "Mancha carmelita", se le tratará con 2 - 5 g de MANCOZIL por cada kg de semilla. Los granos de arroz deben mezclarse con el fungicida en polvo en una manta o en un depósito apropiado a la cantidad de semilla que se desee desinfectar, procurando conseguir la uniformidad de contacto del producto con las semillas, mediante el movimiento lento.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben hacerse en intervalos de 7 a 14 días, en casos de severos ataques de la enfermedad de 4 a 5 días. Se recomienda 3 aplicaciones por campaña.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

MANCOZIL es compatible con la mayoría de plaguicidas, exceptuando los de reacción alcalina.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECIFICO:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS g/100 L de agua	LMR** (ppm)	PC* (días)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Hielo o ranchar	Phytophthora infestans	200-250	0.1	10
	Mancha negra	Alternaria solani			28
Tomate	Hielo o ranchar	Phytophthora infestans	200-250	2.0	28
	Mancha negra	Alternaria solani			
Algodón	Mancha de la hoja	Alternaria tenuis	200-250	2.0	28
Naranja	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200-250	2.0	28
Pepinillo Sandía Melón	Mildiu	Pseudoperonospora cubensis	200-250	4.0	7
Haba	Cercosporiosis	Cercospora capsici	200-250	0.5	7
Ají	Cercosporiosis	Cercospora capsici	200-250	0.5	7
Arroz (Semilla)	Mancha carmelita	Helminthosporium oryzae	2 - 5 g/kg de semilla	4.0	7

* PC=Periodo de carencia (en días)

**LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)

