

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.

No aplicar en dirección contraria al viento.

No vierta el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua.

Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave y lejos del alcance de niños y animales domésticos.

Usar protección ocular y respiratoria, guantes protectores y ropa apropiada durante la manipulación en almacenamiento, al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.

No aplicar en ambientes cerrados o de poca ventilación.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.

Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Spiroketalamina

En caso de accidentes, retirar al paciente del área contaminada. Retirar la ropa. Después de la inhalación sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de contaminación dermal lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua. Avisar de inmediato a un médico. Si se ha ingerido, dar de beber agua y una suspensión de 20 a 30 g de carbón activado de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas. Inducir al vómito sólo si la persona se encuentra perfectamente consciente. Antes administrar grandes cantidades de una solución de claras de huevo batidas o leche de magnesia.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO

Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO

No se ha determinado un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM:0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

Peligrosos para abejas, no aplicar durante el vuelo de las abejas.

Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Mantenga franjas de protección de fuentes de agua, de por lo menos 1 metro de distancia.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Spiroxamine, 530 g/L
Aditivos csp, 1 L

Reg. PQUA N° 014-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC
Colombia.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto: 1 litro**

Lote N. _____
Fecha de Formulación: _____
Fecha de Vencimiento: _____



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PROSPER 500 EC es un fungicida perteneciente al grupo de las spiroketalamine. Tiene acción preventiva, curativa y erradicativa para el control de oidium en vid, alcachofa, pimiento y stemphylium en el cultivo de espárrago.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS %	DOSIS l/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico				
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.06	--	35	2
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.5-0.6	N.d	0.05
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.10- 0.15	0.5- 0.6	N.d	0.05
Espárrago	Stemphylium	<i>Stemphylium vesicarium</i>	--	0.75	N.d	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos n/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En vid, aplicar preventivamente durante el brotamiento dependiendo de la zona, condiciones climáticas y susceptibilidad de las variedades a la enfermedad.

Aplique preventivamente.

No realizar más de 3 ó 4 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

A las 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y riesgo de combinado antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

