

Prosper[®] 500 EC

Spiroxamina 500 g/l

Formulación	: Emulsión concentrada.
Modo de Acción	: Fungicida sistémico. Posee propiedades preventivas, curativas y erradicativas.
Mecanismo de Acción	: Inhibidor de la biosíntesis del Esterol en la Δ^{14} reductasa y la Δ^8 y Δ^7 isomerasa.
Toxicidad	: Moderadamente Peligroso.
Grupo Químico	: Spiroketalaminas

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y erradicativa para el control del Oidium en los cultivos de vid, pimiento y alcachofa. Novedoso mecanismo de acción, por lo que es recomendado para ser aplicado en Estrategias de Manejo de Resistencia, en aplicaciones alternante o en mezcla con triazoles y estrobilurinas

Indicaciones de Uso

Es un fungicida perteneciente al grupo de las Spiroketalaminas. Tiene acción preventiva, curativa y erradicativa.

En vid, aplicar preventivamente al momento del brotamiento dependiendo de la zona, condiciones climáticas y susceptibilidad de las variedades a la enfermedad. No realizar más de 3 o 4 aplicaciones foliares por campaña.

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y riesgo de combinado antes de las aplicaciones.

Muy buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados

Primeros Auxilios

En casos de accidentes, retirar al paciente del área contaminada. Retirar la ropa. Después de la inhalación sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de contaminación dermal lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua. Avisar de inmediato a un médico

Si se ha ingerido, dar de beber agua y una suspensión de 20 a 30 g de carbón activado de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas. Inducir el vómito sólo si la persona esta consiente. Antes administrar grandes cantidades de una solución de claras de huevo batidas o lecha de magnesia

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico



Prosper[®] 500 EC

Spiroxamina 500 g/l

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS %	DOSIS l/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	AGENTE CAUSAL				
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.06	-	35	2
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.5 – 0.6	n/d	0.05
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.1 – 0.15	0.5 – 0.6	n/d	0.05
Espárrago	Stemphylium	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.75	n/d	0.05

*PC=Periodo de carencia
**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

Envases : Frasco x 250 ml
Frasco x 1 lt

Numero de Registro : PQUA N° 014-SENASA

