

LFE0029-001

10.7 cm

0.5 cm

12 cm

1 cm

4 cm

1 cm

12 cm

1 cm

4 cm

0.5 cm

1 cm

ZONA DE PEGA



SERENADE[®]
ASO

(*Bacillus amyloliquefaciens*, CEPA OST 713)

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Bacillus amyloliquefaciens (Cepa OST 713) 1.34 %
 Activos 98.66 %
 Total 100.00 %

* Contiene un mínimo de 1×10^8 CFU/g

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PSLA N.º 090-018454

FABRICADO POR:
Bayer de México, S.A. de C.V.
Autopista San Martín Texmelucan - Tlaxcala,
P.O. Box 500, San Felipe Tepic, Oaxaca,
Tlaxcala, C.P. 90200, México.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO
Y DISTRIBUIDOR POR:
BAYER S.A.
Av. Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima Perú
Tel.: (01) 2113800

Contenido
Neto: 1 Litro

® = Marca Registrada del grupo Bayer

PRECAUCION

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Use equipo de protección adecuado. Se recomienda el uso de mascarilla o carilla, anteojos protectores, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto. No mantener este producto en casa de habitación. No se almacene ni se transporte junto con productos alimenticios, ropa o forraje. Almacenar en lugar fresco, seco y a la sombra. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de la aplicación, bañese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta. Síntomas de intoxicación: cefalea, somnolencia, vértigo, sofocación, náuseas, vómitos e irritación de mucosas. Dar de beber un vaso de agua en sorbos, si puede tragar. No induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 a 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO:
Trátase sintomáticamente.

GENERALIDADES: SERENADE ASO es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas y bacteriales. SERENADE ASO contiene la cepa patentada OST 713 de la bacteria *Bacillus amyloliquefaciens*, que brinda una acción antimicrobiana superior comparado con cepas comunes de *B. subtilis*. SERENADE ASO actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del patógeno.

INDICACIONES DE USO: SERENADE ASO se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestres. Para su preparación verter la dosis recomendada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar bien y completar el resto de agua.

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil. 200L	L/Ha		
HOLANTAO	"Oidium"	<i>Erysiphe polygoni</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
VID	"Oidium"	<i>Uncinula necator</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
MANGO	"Oidium"	<i>Oidium mangiferae</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
PAPRIKA	"Pudrición gris"	<i>Leveillula taurica</i> <i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	"Mancha Púrpura"	<i>Sterphylium vesicarium</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i> <i>Leveillula taurica</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
MANDARINO	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.5	--	N.A.	N.A.
FRESA	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.2	--	N.A.	N.A.
TOMATE	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.2	--	N.A.	N.A.
BANANO	"Sigatoka negra"	<i>Mycosphaerella fijensis</i>	1.5 - 2	--	N.A.	N.A.
PALTO	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.2 - 1.5	--	N.A.	N.A.
ARANDANOS	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	2	--	N.A.	N.A.
CAFÉ	"Roya"	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.5	--	N.A.	N.A.
ARROZ	"Anublo bacterial de la panicula"	<i>Burkholderia glumae</i>	1.5	--	N.A.	N.A.
QUINUA	"Mildiu"	<i>Peronospora farinosa</i>	1.5	--	N.A.	N.A.
VID	"Pudrición ácida"	<i>Penicillium sp.</i> , <i>Aspergillus sp.</i> , <i>Rhizopus sp.</i>	1.5	--	N.A.	N.A.
PAPA	"Rhizoctonia"	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.5	1.875	N.A.	N.A.
LECHUGA	"Fusarium"	<i>Fusarium oxysporum</i>	1.5	1.8 - 2.25	N.A.	N.A.

N.A. = No aplica. PC = Período de carencia. No hay restricciones.
L.M.R. = Límite máximo de residuos. Está exento de tolerancia de residuos en todos los cultivos agrícolas

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: se recomienda efectuar las aplicaciones de manera preventiva antes de que se presenten síntomas evidentes de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para la presencia del patógeno.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

TOXICOLOGÍA:

DL50 Oral y Dermal aguda: > 5000 mg/kg

ANTIDOTO:

No hay un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas".

Lote N.º:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO IMPRIME
Área reservada de brillo

