

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación. No aplicar en dirección contraria al viento.

No vierta el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua. Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave y lejos del alcance de niños y animales domésticos.

Usar máscara, guantes protectores y ropa apropiada al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.

No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.

Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Azoles (Tebuconazole) e Hidroxianilidas (Fenhexamid).

Retirar inmediatamente la ropa contaminada o empapada. Si se ha contaminado la piel, lavar con abundante agua y jabón. No usar solventes. Si se han contaminado los ojos, lavar a fondo con abundante agua corriente y consultar un oculista. En caso de ingestión oral, dar de beber agua (No leche ni alcohol) y una suspensión de 20 a 30 g de carbón medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas. Inducir el vómito sólo si la persona se encuentra completamente consciente.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO

Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO: No se ha determinado un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CICOTOX: 0800-1-3040 **CISPROQUIM:** 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No disponer con residuos municipales. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.



Teldor® Combi 416.7 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Tebuconazole, 66.7 g/L
Fenhexamid, 350 g/L
Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N° 016-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC-Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro Lima - Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE**

**Contenido
Neto:**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TELDOR COMBI 416.7 SC es un fungicida formado por los ingredientes activos tebuconazole (grupo químico: azoles) y fenhexamid (grupo químico: hidroxianilidas). TELDOR COMBI 416.7 SC actúa de forma preventiva y curativa y con acción residual para el control de botritis en tomate.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	%	ml/cil	L/ha		
TOMATE	“Botritis”	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	500	1	7	0.2
VID	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.08	160	---	3	2
ALCACHOFA	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	---	---	1-1.5	3	0.02

*PC = Período de Carencia (días)

**LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)

NOTA: Emplear la dosis en porcentaje (%) ó ml/cil cuando se use pulverizadora manual; para aplicaciones en tractor o mochila a motor emplear la dosis en L/ha previa calibración del gasto de agua por ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente a partir de la floración y cuajado de frutos.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares excepto los de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

