

**LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGANSE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Y APLICACIÓN**

- Durante su aplicación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Usar máscara y guantes protectores.
- Luego lavarse las partes del cuerpo expuesto al contacto con el producto, y cambiarse de ropa. No coma, fume, ni beba durante la aplicación.
- Almacene en envases herméticamente cerrados en lugares frescos, ventilados, lejos del alcance de los niños y no expuestos a la luz.
- No verter los restos del caldo de aspersión a fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

-En caso de contacto con los ojos o piel, lavarse inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste buscar ayuda médica.

No se conoce ningún antídoto específico.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA
EN CASO DE INTOXICACION:**

CICOTOX: 0800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No mezclar con residuos municipales.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL AMBIENTE:**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

XenTari® WDG

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

Composición:

Bacillus thuringiensis, subesp. aizawai, Serotipo H-7, cepa ABTS-1857, toxina activa de lepidópteros 10,3%
Aditivos csp, 100,0%

Contiene 35 000 unidades de Plutella/mg de producto

Reg.: PBUA Nro 003-SENASA

Formulado por:
VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
870 Technology Way
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
Tel. (1) 847-968-4790

Titular del Registro:
SMTM Perú S.A.C
Av. República de Panamá 3531,
Of. 1203 - Lima 27
T: 511-421-4811



Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Telf. 211-3800

Contenido Neto:

Lote No:
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- XenTari WDG es un insecticida biológico que controla larvas de lepidópteros sin perturbar poblaciones de insectos benéficos.
- Actúa por vía estomacal; las larvas deben comer los depósitos (cristales) de XenTari WDG para ser afectadas; luego de la ingestión de dosis letales de XenTari WDG, las larvas dejan de alimentarse y mueren en un lapso de horas a 3 días.
- Es recomendable realizar aplicaciones al inicio de la infestación.
- Se emplea en pulverizaciones, previa mezcla en agua. Es aconsejable preparar una pre-mezcla en un volumen de agua, luego se le agrega el resto de agua. Se debe realizar una buena cobertura para obtener depósitos uniformes de XenTari WDG sobre las áreas de alimentación de las larvas. Se recomienda siempre el uso de un adherente, humectante y dispersante como Agridex.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS			PC* (DIAS)	LMR** (PPM)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO	kg/ha	%	g/cil		
Algodón	Gusano mayor de hoja	Alabama argillacea	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
	Gusano menor de hoja	Anomis texana	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
	Gusano perforador de bellota	Heliothis virescens	0,5 - 2,0	0,1 - 0,4	200 - 800		
Alfalfa	Cogollero	Crociodocema aporema	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
	Caballada	Anticarsia gemmatalis					
Col Rapollo Brócoli	Plutella	Plutella maculipennis	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
Tomate	Polilla	Scorbipalpa absoluta	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
	Gusanos del fruto	Prodenia eridania					
Espárrago	Gusano de tierra	Agrotis sp	0,5 - 2,0	0,1 - 0,4	200 - 800		
Frijol Vainita	Gusano medidor	Pseudoplusia includens	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
Manzano	Polilla	Cydia pomonella	-	0,1	200		
Melon Sandía	Gusano barrenador de brotes	Diaphania sp	0,5 - 1,0	0,1 - 0,2	200 - 400		
Olivo	Barreno del brote	Palpita quadristigmalis	-	0,1	200		
Arandanos	Gusano perforador	Heliothis virescens	1	-	-		
Quinua	Gusano comedor	Spodoptera frugiperda	1,5	-	-		

*PC = Última aplicación antes de la cosecha (días) **LMR = Límite Máximo de residuos (ppm)
* = No existen restricciones en la aplicación de XenTari WDG antes de la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar de acuerdo al nivel de infestación, al inicio de la aparición de posturas.
PERIODO DE REINGRESO: el ingreso al área tratada debe hacerse puede hacerse 4 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de su aplicación.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad de acuerdo al patrón de uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

©=Marca Registrada de Valent BioSciences Corporation, U.S.A.



PRECAUCION

